

**BIJSLUITER**

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### Differin Gel 1 mg/g, gel

adapaleen

#### Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### In deze bijsluiter:

1. Wat is Differin en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Differin gebruikt
3. Hoe wordt Differin gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Differin
6. Aanvullende informatie

### 1. WAT IS DIFFERIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het werkzame bestanddeel in Differin is adapaleen. Dit heeft een ontstekingsremmend effect en vermindert pijn en irritatie.

Het wordt toegepast bij acne op het gezicht, op de borst of op de rug, op plaatsen waar zich op de huid veel mee-eters, harde rode puistjes en/of zachte pussende puistjes bevinden.

Differin wordt slechts in zeer geringe hoeveelheden in het lichaam opgenomen en heeft weinig effect, behalve op het oppervlak van de huid.

### 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIFFERIN GEBRUIKT

#### Gebruik Differin niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor adapaleen of voor één van de andere bestanddelen van Differin.

#### Wees extra voorzichtig met Differin

- Gebruik Differin niet op een beschadigde huid (snij- en schaafwonden) of wanneer u last heeft van eczeem op de plaats waar u acne heeft.
- Vermijd contact met uw ogen, mond of neusgaten, en vermijd contact met andere gevoelige huidgedeeltes.
- Vermijd blootstelling aan zonlicht of kunstmatige UV-straling (zonnebank).
- Wanneer u tijdens het gebruik van Differin last krijgt van overgevoeligheid of irritatie, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts. Uw arts kan u voorschrijven de gel minder vaak te gebruiken of tijdelijk met het gebruik te stoppen.

#### Gebruik met andere geneesmiddelen

- Andere geneesmiddelen tegen acne (die benzoylperoxyde, erytromycine of clindamycine bevatten) kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Deze andere geneesmiddelen moeten dan 's ochtends worden aangebracht, en Differin 's avonds.
- Cosmetica mogen worden gebruikt, maar deze dienen geen mee-eters (comedonen) te veroorzaken en geen uitdrogend effect op de huid te hebben.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

- Differin mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Mocht u tijdens het gebruik van Differin zwanger worden dan moet u stoppen met de behandeling, en zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts voor nader overleg.
- Differin kan worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Breng Differin echter niet aan op de borst als u borstvoeding geeft, om er voor te zorgen dat uw kind er mee in aanraking komt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Differin**

De hulpstof propyleenglycol (E1520) kan huidirritatie veroorzaken. De hulpstof methylparahydroxybenzoesaat (E218) kan, mogelijk vertraagde, allergische reacties veroorzaken.

## **3. HOE WORDT DIFFERIN GEBRUIKT**

Volg bij het gebruik van Differin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

- Differin is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder.
- Differin is alleen bedoeld voor uitwendig gebruik.
- Differin moet 's avonds voor het slapen gaan worden aangebracht, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven.
- Was de te behandelen huidgedeelten goed met water. Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is voordat u Differin aanbrengt.
- Breng met uw vingertoppen een dun laagje van de gel aan op de plaatsen die door (jeugd)puistjes zijn aangetast, en wrijft de gel zacht in.
- Was na het aanbrengen van de gel uw handen.
- Hoe lang u moet doorgaan met het gebruik van Differin hangt af van hoe snel de acne verbetert. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw arts wanneer u Differin drie maanden heeft gebruikt. Uw arts kan dan de mate van verbetering van uw acne beoordelen.

### **Wat u moet doen als u meer van Differin heeft gebruikt dan u zou mogen, of wanneer u de gel per ongeluk heeft ingeslikt**

Als u te veel Differin op de huid aanbrengt leidt dit niet tot snellere resultaten, en uw huid kan geïrriteerd en rood worden. Ook kunnen schilfering (peeling) en pijn optreden.

Neem contact op met uw arts in het ongebruikelijke geval dat u de gel per ongeluk heeft ingeslikt.

### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Differin te gebruiken**

Maakt u zich niet ongerust als u bent vergeten Differin op het juiste moment te gebruiken. Zodra u er aan denkt begint u weer met het gebruik van de gel, op dezelfde wijze als voorheen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

- Zoals alle geneesmiddelen kan Differin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Differin kan de volgende bijwerkingen veroorzaken op de plaats waar de gel wordt aangebracht.

*Vaak optredende bijwerkingen ( treden op bij minder dan 1 op de 10 personen:*

- droge huid
- huidirritatie
- branderig gevoel in de huid
- rood worden van de huid (erytheem)

*Soms optredende bijwerkingen ( treden op bij minder dan 1 op de 100 personen):*

- plaatselijk huidreacties (huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis))
- huidongemakken
- zonnebrand
- jeuk (pruritus)
- schilfering
- verergering van acne

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn pijn of het opzwellen van de huid, en irritatie, roodheid, jeuk of opzwellen van de oogleden.

- Wanneer één van deze bijwerkingen bij u optreedt of als u last krijgt van een andere bijwerking, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U DIFFERIN**

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Gebruik Differin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube en op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Wat bevat Differin**

- Het werkzame bestanddeel is adapaleen. Differin bevat 1 mg/g adapaleen.
- De andere bestanddelen zijn carbomeer 940, propyleenglycol (E1520), poloxamer 182, dinatriumedetaat, methylparahydroxybenzoaat (E218), phenoxyethanol, natriumhydroxide en gezuiverd water.

### **Hoe ziet Differin er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Differin is een witte gel. Het is op recept van uw arts verkrijgbaar in tubes van 30 g, 45 g, 50 g of 60 g.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de handelsvergunning:*

nv Galderma Belgilux sa  
Rijksweg 14  
2870 Puurs  
België

*Fabrikant:*

Laboratoires Galderma

Zone Industrielle Montdésir  
74540 Alby Sur Cheran  
Frankrijk

*Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland:*

Galderma  
Avelingen-West 3  
4202 MS Gorinchem  
0183 - 691919

**Inschrijving in het Register**

In Nederland in het register ingeschreven onder RVG 32496

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2009**