

**Glabbellalijnen (rimpels)
Behandeling met Azzalure®
(botulinetoxine A)**

**Antwoorden
op een aantal van
uw vragen**

AZZALURE 
botulinetoxine type A



Antwoorden op een aantal van uw vragen

Wat veroorzaakt rimpels?

Telkens wanneer u lacht, fronst, zich concentreert of uw ogen dichtknijpt, trekken uw gezichtsspieren zich samen waardoor er rimpels en lijnen ontstaan. Bij het ouder worden verliest uw huid zijn elasticiteit en kunnen deze groeven dieper worden en definitief in uw gezicht worden gegrift. Vooral fronslijnen tussen de wenkbrauwen kunnen duidelijk zichtbaar worden, waardoor u boos en bezorgd kijkt, zelfs wanneer dat niet het geval is.

Wat zijn de behandel mogelijkheden voor gezichtsrimpels?

Uitgesproken gezichtsrimpels kunnen worden gecorrigeerd door een operatie, injectie met vulmaterialen of geneesmiddelen, zoals botulinetoxine type A, of een combinatie van deze verschillende methoden. Welke van deze methoden voor u de juiste is, hangt af van de plaats, het type en de ernst van de rimpels.

Wat houdt behandeling met botulinetoxine in?

Botulinetoxine A is een natuurlijk voorkomend, bacterieel eiwit. Kleine doses van deze substantie worden direct onder de huid geïnjecteerd, in de spieren die behandeld worden om rimpels te verminderen. Het blokkeert specifiek de zenuwimpuls, waardoor de spieren die verantwoordelijk zijn voor de overmatige samentrekkingen die

AZZALURE 

rimpels veroorzaken, ontspannen. Andere zenuwfuncties, zoals de tastzin van de huid, worden niet aangetast.

De behandeling bestaat uit 5 injecties boven en tussen de wenkbrauwen. De behandeling veroorzaakt nauwelijks ongemak en u kunt zeer snel na de behandeling uw gewone activiteiten hervatten.

Hoe lang heeft u baat bij de behandeling van glabellalijnen met botulinetoxine?

Het eerste effect van de Azzalure®-behandeling wordt binnen ongeveer 2 tot 3 dagen zichtbaar. Het effect van de injecties is altijd tijdelijk. Het effect houdt meestal 4 maanden en soms langer aan. Wanneer de volgende behandeling plaatsvindt, hangt af van de duur van het effect bij de individuele patiënt. Het is van belang dat de behandeling niet vaker dan eenmaal per 3 maanden wordt herhaald.

Wat zijn de risico's en bijwerkingen van botulinetoxine?

Meld het uw dokter wanneer u een bijwerking constateert.

Bijwerkingen die na behandeling met botulinetoxine A voor deze indicatie zijn waargenomen, bestaan voornamelijk uit reacties op de injectieplaats, zoals pijn of een onaangenaam, stekend of beurs gevoel. Het is ook mogelijk dat u hoofdpijn krijgt. Het komt minder vaak voor dat de werking van botulinetoxine zich uitbreidt naar onbedoelde spieren rond de fronslijnen, wat leidt tot een ongewild en tijdelijk hangen van het bovenste ooglid, een vermoeid oog, gezwollen ooglid, tranend oog, droog oog en trekken van spieren rondom het oog.

In zeldzame gevallen kunnen verstoord, vaag of dubbel zien of oogbewegingsaandoeningen voorkomen. Duizeligheid, jeuk, uitslag en allergische reacties zijn ongewone bijwerkingen.

Deze bijwerkingen treden meestal op in de eerste week na de injecties, duren niet lang en zijn licht tot matig in ernst.

Het risico op mogelijk gevaarlijke bijwerkingen is zeer gering, maar kan toenemen bij patiënten met slikaandoeningen, bepaalde neuromusculaire aandoeningen, bestaande longproblemen of bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen die de werking van botulinetoxine kunnen versterken. Het is belangrijk dat u de behandelende arts inlicht wanneer u momenteel lijdt, of in het verleden heeft geleden, aan een ziekte en als u behandeld wordt met een geneesmiddel.

Als u om andere redenen onder behandeling bent van artsen of andere hulpverleners, meldt deze dan dat u een botulinetoxinebehandeling ondergaat.

De bijsluiter in de geneesmiddelverpakking geeft meer informatie over de mogelijke bijwerkingen. Bespreek het met uw arts als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt.

De volgende bijwerkingen verdienen extra aandacht en u dient direct medische hulp te vragen in geval u ze vaststelt:

- u heeft moeite met ademen, slikken of spreken
- uw gezicht zwelt op, uw huid wordt rood of u krijgt een jeukerige uitslag met bultjes. Dit kan betekenen dat u allergisch reageert op Azzalure®.

Als u om andere redenen onder behandeling bent van artsen of andere hulpverleners, meldt deze dan dat u een botulinetoxinebehandeling ondergaat.

De bijsluiter in de geneesmiddelpakking geeft meer informatie over de mogelijke bijwerkingen. Bespreek het met uw arts als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt.



Wat moet ik doen als ik denk dat er bij mij bijwerkingen optreden?

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u na een injectie met botulinetoxine moeite heeft met slikken, spreken of ademen of als zich hevige spierzwakte of een allergische reactie voordoet. Wanneer uw behandelende arts niet beschikbaar is, zoek dan onmiddellijk andere medische hulp. Mogelijk heeft u speciale zorg nodig om te voorkomen dat de complicaties erger worden.

Indien u vermoedt dat er bij u een bijwerking optreedt na behandeling met botulinetoxine A die anders is dan de bijwerkingen waarbij u onmiddellijk medisch hulp moet inroepen (zie boven) dan dient u dit direct met uw behandelende arts te bespreken.

Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

